

Calendario de inmunización contra enfermedades respiratorias infecciosas

CONSIDERACIONES SOBRE LA VACUNA PARA POBLACIONES ADULTAS ESPECIALES:

ADULTAS EMBARAZADAS

La mejor protección contra muchas enfermedades respiratorias infecciosas son las inmunizaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan las inmunizaciones para proporcionar protección, aumentar nuestras defensas y limitar la gravedad, la propagación y la amenaza generalizada de las enfermedades. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de inmunizaciones disponibles y recomendadas para su uso, consulte [aquí](#).

TOSFERINA (TOS CONVULSA)¹	Las adultas embarazadas deben recibir la vacuna Tdap durante el tercer trimestre (de 27 a 36 semanas) de cada embarazo.
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA²	No hay recomendaciones oficiales para la vacuna antineumocócica para adultas embarazadas. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus antecedentes de vacunación y sus factores de riesgo para determinar cuáles son las opciones de vacunación.
VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS)³	Las adultas embarazadas que tengan entre 32 y 36 semanas de embarazo durante la temporada de VRS (de septiembre a enero) deben recibir una dosis de la vacuna materna contra el VRS. Los bebés nacidos de padres biológicos que reciban la vacuna contra el VRS al menos 2 semanas antes del parto tendrán protección y no necesitarán una inmunización contra el VRS. Para obtener más información sobre bebés y niños pequeños, consulte aquí .
INFLUENZA (GRIPE)⁴	Las adultas embarazadas deben recibir su vacuna anual contra la gripe si están embarazadas durante la temporada de gripe, que suele empezar en otoño. Las adultas embarazadas no deben recibir la vacuna contra la gripe en aerosol nasal.
COVID-19⁵	Los CDC recomiendan que todas las personas a partir de los 6 meses de edad reciban la vacuna actualizada contra el COVID-19, incluidas las adultas que estén embarazadas, en periodo de lactancia, intentando quedar embarazadas o que puedan quedar embarazadas en el futuro.



Calendario de inmunización contra enfermedades respiratorias infecciosas

CONSIDERACIONES SOBRE LA VACUNA PARA POBLACIONES ADULTAS ESPECIALES:

ADULTOS INMUNODEPRIMIDOS

La mejor protección contra muchas enfermedades respiratorias infecciosas son las inmunizaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan las inmunizaciones para proporcionar protección, aumentar nuestras defensas y limitar la gravedad, la propagación y la amenaza generalizada de las enfermedades. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de inmunizaciones disponibles y recomendadas para su uso, consulte [aquí](#).

TOSFERINA (TOS CONVULSA)¹

Las recomendaciones de vacunación contra la tosferina para adultos inmunodeprimidos son coherentes con los lineamientos para la población general.

Los adultos que nunca se hayan vacunado contra la tosferina deben recibir una dosis única de la vacuna Tdap. Después de recibir la vacuna Tdap, los adultos deben continuar recibiendo las vacunas Td o Tdap para la vacunación de refuerzo de rutina cada 10 años.

ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA²

Los adultos inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por enfermedad neumocócica.

Las personas inmunodeprimidas o con otros factores de riesgo pueden necesitar vacunas antineumocócicas adicionales para proporcionar protección contra la enfermedad:

ANTECEDENTE DE VACUNAS

RECOMENDACIÓN DE VACUNA

Nunca recibieron una vacuna antineumocócica

1 dosis de PCV15 seguida de 1 dosis de PPSV23 un año después **or** 1 dosis de PCV20

Solo recibieron PPSV23

1 dosis de PCV15 **or** 1 dosis de PCV20

Recibieron PCV13 con o sin una dosis adicional de PPSV23

1 dosis de PCV23 **or** 1 dosis de PCV20

Hable con su proveedor de atención médica sobre sus antecedentes de vacunación y sus factores de riesgo específicos para determinar su mejor opción de vacunación.

VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS)³

Las recomendaciones de vacunación contra el VRS para adultos inmunodeprimidos son coherentes con los lineamientos para la población general.

No se recomienda la vacunación contra el VRS en adultos menores de 60 años.

INFLUENZA (GRIPE)⁴

Las recomendaciones de vacunación contra la gripe para adultos inmunodeprimidos son coherentes con los lineamientos para la población general.

Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe cada año, a partir del otoño.

COVID-19⁵

Todas las personas mayores de 6 meses con inmunodepresión moderada o grave necesitan al menos una dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19.

Los adultos con inmunodepresión pueden necesitar más de una dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19 para considerarse al día:

ANTECEDENTE DE VACUNAS

RECOMENDACIÓN DE VACUNA

Nunca recibieron ninguna vacuna contra el COVID-19

2-3 dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19

Solo recibieron una vacuna previa contra el COVID-19

1-2 dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19

Recibieron 2 o más vacunas previas contra el COVID-19

1 vacuna actualizada contra el COVID-19

Hable con su proveedor de atención médica para asegurarse de que está al día.