

## Calendario del tratamiento con antivirales

Los fármacos antivirales son herramientas importantes para ayudar a tratar el COVID-19 y la gripe que pueden ayudar a disminuir los síntomas y disminuir el riesgo de hospitalización, especialmente para las personas con mayor riesgo de enfermedad grave. **Los antivirales son tratamientos que requieren receta médica y deben administrarse en las primeras etapas de la enfermedad, después de que comienzan los primeros síntomas.**

La gripe y el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son causadas por distintos virus. Si bien algunos síntomas son los mismos, la Gripe y el Covid-19 son distintos. Se necesitan pruebas específicas para determinar cuál es la enfermedad y confirmar un diagnóstico. **Recibir tratamiento temprano para el COVID-19 y la gripe puede reducir el riesgo de enfermarte gravemente.**

## ANTIVIRALES CONTRA EL COVID-19

Si tienes más de 50 años, diabetes, cáncer, afecciones de salud mental, obesidad, asma u otras afecciones de salud, es posible que tengas un riesgo mayor de enfermarte gravemente por COVID-19. Si tienes COVID-19, hay dos medicamentos antivirales orales disponibles para ayudar a reducir tu riesgo a la enfermedad: Paxlovid y Lagevrio. También hay una opción intravenosa (i.v.), Veklury (remdesivir), que se puede administrar en centros de atención médica.

Es importante actuar rápidamente para obtener los mejores resultados. **Ante la primera señal de cualquier síntoma como fiebre, tos o dificultad para respirar, hazte una prueba de COVID-19. Si el resultado de la prueba es positivo, comunícate con un proveedor de atención médica para hablar sobre el tratamiento.**

### TRATAMIENTOS CON ANTIVIRALES ORALES PARA EL COVID-19

▶ Debe iniciarse dentro de los 5 días posteriores a la aparición de los síntomas.

DÍA 1

▶ **Los síntomas comienzan:** al primer síntoma de fiebre, tos o dificultad para respirar, hazte una prueba de COVID-19. Si el resultado de la prueba es positivo, comunícate con un proveedor de atención médica para hablar sobre el tratamiento.

DÍA 1 a 5

▶ Hay un breve margen de tiempo para iniciar un tratamiento con antivirales orales para el COVID-19.  
**Paxlovid (adultos y niños mayores de 12 años de edad):** medicamento oral que debe tomarse lo antes posible y hasta 5 días después del inicio de los primeros síntomas.  
**Lagevrio (adultos):** medicamento oral que deben tomarse lo antes posible y hasta 5 días después del inicio de los primeros síntomas.

### TRATAMIENTO CON ANTIVIRAL INTRAVENOSO PARA EL COVID-19

▶ Debe iniciarse dentro de los 7 días posteriores a la aparición de los síntomas.

DÍA 1

▶ **Los síntomas comienzan:** al primer síntoma de fiebre, tos o dificultad para respirar, hazte una prueba de COVID-19. Si el resultado de la prueba es positivo, comunícate con un proveedor de atención médica para hablar sobre el tratamiento.

DÍA 1 a 5

▶ Hay un breve margen de tiempo para iniciar un tratamiento con antivirales intravenosos para el COVID-19.  
**Veklury (adultos y niños de al menos 28 días de edad y con un peso de 7 lb):** el medicamento intravenoso es administrado en un centro de atención médica y debe administrarse lo antes posible y hasta 7 días después de que comiencen los síntomas.

Fuentes: [cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html](https://cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html), [cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm](https://cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm)



Para obtener más información sobre los síntomas y riesgos, visita:  
[cveep.org/es/respiratory](https://cveep.org/es/respiratory)

**CVEEP**  
Defensores de  
la Educación, la Equidad +  
el Progreso de la Vacunación

ACTUALIZADO: 06/2024