

Calendario de inmunización contra enfermedades respiratorias infecciosas

Consideraciones sobre vacunas para ADULTOS CON MAYOR RIESGO

La mejor protección contra muchas enfermedades respiratorias infecciosas son las inmunizaciones. Las inmunizaciones pueden ayudar a proporcionar protección, aumentar nuestra respuesta inmunitaria y pueden limitar la gravedad, la propagación y la amenaza generalizada de las enfermedades. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de inmunizaciones disponibles y recomendadas para su uso, consulta [aquí](#).

TOSFERINA (TOS CONVULSA)¹	Los adultos que nunca se hayan vacunado contra la tosferina deben recibir una dosis única de la vacuna Tdap. Después de recibir la vacuna Tdap, los adultos deben continuar recibiendo las vacunas Td o Tdap para la vacunación de refuerzo de rutina cada 10 años.	
ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA²	Los adultos de 19 a 49 años pueden necesitar más dosis de la vacuna antineumocócica que las que recibieron en la infancia si tienen ciertas condiciones de riesgo. El tipo de vacuna antineumocócica y la cantidad de dosis que necesitas van a depender de tu condición específica y de las vacunas que ya te hayas puesto. Si padeces de una condición de riesgo, habla con tu proveedor de salud acerca de las opciones para vacunarte.	
VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (VRS)³	Los adultos de 60 a 74 años que tienen un mayor riesgo de infección grave por el VRS deben recibir una dosis única de la vacuna contra el VRS. No se recomienda la vacunación contra el VRS en adultos menores de 60 años.	
INFLUENZA (GRIPE)⁴	Las recomendaciones de vacunación contra la gripe para adultos inmunodeprimidos son coherentes con los lineamientos para la población general. Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe cada año, a partir del otoño.	
COVID-19⁵	HISTORIAL DE VACUNACIÓN	RECOMENDACIÓN DE VACUNAS
	Nunca he recibido ninguna de las vacunas COVID-19	Serie inicial: Completa una serie inicial de dosis múltiples con la vacuna contra el COVID-19 que sea apropiada para tu edad. Dosis adicional: 1 dosis, 6 meses después de terminar la serie inicial (con un intervalo mínimo de 2 meses).
	Serie inicial de dosis múltiples completada previamente	Para estar al día y recibir la última vacuna contra el COVID-19: recibe 2 dosis apropiadas para tu edad, con un intervalo de 6 meses (intervalo mínimo de 2 meses).
	Consulta con tu proveedor de atención médica para asegurarte de estar al día. Todas las personas mayores de 6 meses con inmunodepresión moderada o grave necesitan al menos una dosis de la vacuna actualizada contra el COVID-19.	